

Frühwarnscore

Score zur objektiven Beurteilung des klinischen Zustands

Empfohlen vom »Institute for Healthcare Improvement« – www.ihl.org

	3	2	1	0	1	2	3
Pulsfrequenz pro Minute		< 40	40 – 50	51 – 100	101 – 110	111 – 129	≥ 130
Systolischer Blutdruck	≤ 70	71 – 80	81 – 100	101 – 159	160 – 199	200 – 220	> 220
Temperatur in °C		< 35,0	35,05 – 36,0	36,05 – 38	38,05 – 38,5	≥ 38,55	
Atemfrequenz pro Minute		< 8	8	9 – 17	18 – 20	21 – 29	≥ 30
Bewusstseinszustand	Keine reaktion	reagiert auf Schmerzreiz	reagiert auf Ansprachen	normal		neu aufgetretene Verwirrtheit	

Die Blue Safety Cards dienen als Hilfsmittel – AssekuRisk übernimmt keine Haftung für Schäden aus deren Anwendung www.assekurisk.eu

Frühwarnscore

Score zur objektiven Beurteilung des klinischen Zustands

Empfehlungen

0-1 Punkt

Kontrolle in maximal 3 Stunden

2-3 Punkte

Rücksprache mit diensthabendem verantwortlichen Arzt – Kontrolle in 1 Std.

4-5 Punkte

Sofortige Untersuchung durch diensthabenden verantwortlichen Arzt

≥ 6 Punkte

Intensivmediziner kontaktieren

i In unklaren Situationen ist in jedem Fall der diensthabende verantwortliche Arzt zu verständigen.

Gegebenenfalls helfen

- ▶ Urinausscheidung
 - ▶ ein Labor
 - ▶ Blutgasanalyse oder Sauerstoffsättigung (Pulsoxymeter)
- zur Festlegung des weiteren Vorgehens.